

Cuidado post-tratamiento de Kybella

- ❖ No masajee ni manipule el área tratada, que estará bastante hinchada después de las inyecciones de Kybella®. La hinchazón será peor en los primeros dos días y se debe principalmente a la inflamación localizada. La hinchazón inicial puede tardar hasta 2 semanas en disminuir. Dormir con la cabeza elevada y aplicar compresas frías pueden minimizar este efecto secundario. Puede ducharse y lavarse la cara con un limpiador suave. Evite tratamientos faciales, peelings químicos o tratamientos con láser en el área tratada durante 14 días.
- ❖ Es normal experimentar algo de dolor y sensibilidad en las áreas de inyección. La mayoría de los pacientes encuentran que el Tylenol puede ayudar a aliviar este dolor posterior a la inyección. Evite los AINE como Motrin e ibuprofeno, ya que pueden empeorar la hinchazón y los hematomas.
- ❖ Evite el ejercicio vigoroso durante las primeras 48 horas después del procedimiento para reducir la hinchazón y los hematomas.
- ❖ No aplique maquillaje en el área de tratamiento durante 24 horas.
- ❖ Tenga en cuenta que puede experimentar algo de dolor leve, hinchazón, hematomas o enrojecimiento en el área de tratamiento. Los hematomas pueden durar hasta 2 semanas.
- ❖ Los primeros días después de su tratamiento, el área tratada estará hinchada; llevará semanas que los resultados sean notables. Recomendamos no evaluar los resultados hasta completar su curso de tratamiento.
- ❖ Siempre programamos cada tratamiento con un mes de diferencia, realizando una evaluación completa un mes al final del curso de tratamiento.